肺吸蟲 表皮의 微細構造

가톨릭大學 醫學部 寄生蟲學教室

崔 源 永 · 劉 載 乙

緒 論

肺吸蟲은 우리나라에서 아직도 解決되지 못한 風土病의 하나로서 國民保健上 撲滅對策이 時急하다. 本蟲의 形態學的 研究에 對하여는 光學顯微鏡上 잘 알려져 있으나 그 微細構造에 對한 研究는 많지 않다. 特히 本蟲의 表皮構造는 寄生蟲과 宿主와의 相關關係를 理解하고 또한 撲滅對策을 세우는 立場에서, 또는 寄生蟲의 生活史, 寄生部位, 特히 異所寄生의 本態를 究明하는데 있어서도 가장 核心이 되는 器官으로서 注目되고 있다. 따라서 本蟲의 表皮의 微細構造를 깊이 觀察하는 것은 큰 意義가 있다고 본다.

吸蟲類에 關한 微細構造, 特히 表皮에 關한 報告는 Lee(1966)가 肝蛭 및 慢손住血吸蟲 等에 關해서 研究한 記錄이 있다. 그 후 Sato들(1967)은 宮崎肺吸蟲의 精子形成課程에 對하여 電子顯微鏡的 觀察을, 그리고 金鍾煥(1968)은 肝디스토리의 成蟲體表層의 微細構造를 관찰한 바 있다. 그 후 Richard와 Franklin(1970)도 케리코티肺吸蟲에 感染된 고양이의 肺組織을 電子顯微鏡으로 觀察하였고, 또 Hokley(1970)도 慢손住血吸蟲의 體表層을 研究하였으며 이어서 鄭啓憲들(1978)과 Fujino들(1979a&b)은 肝吸蟲의 微細構造, 特히 體表層에 關해서 詳細히 報告하였고 그후 肝吸蟲의 셀카리아를 관찰하여 報告하였다.

肺吸蟲에 關하여는 肥後들(1980)이 肺吸蟲의 셀카리아의 體表의 微細構造를, 그리고 李相文(1981)은 肺吸蟲의 幼若蟲과 成蟲表皮의 微細構造를 관찰하여 報告하였다. 또 Fukuda들(1982)도 肺吸蟲成蟲의 微細構造를 관찰하였다. 그 후 praziquantel이 開發된 후 曲華星들(1982)은 肺吸蟲에 對한 praziquantel의 영향을 電子顯微鏡으로 관찰하였고 또 이길자(1984)도 praziquantel이 肺吸蟲에 미치는 영향을 관찰 보고한 바 있다. 또 Higo와 Ishii(1984)는 肺吸蟲幼若蟲의 表皮를 走査電子顯微鏡으로 관찰하였다. 이와 같이 肺吸蟲의 表皮層에 關한 報告가 몇몇 研究者에 依해서 檢討된 바 있다. 그러나 肺吸蟲을 走査電子顯微鏡으로 보았

을 경우 그 體表面은 極히 巨大하여서 部位에 따르는 相異點이 적지 않은 것 같다. 또한 透過電子顯微鏡的 觀察로도 部位에 따라서 여러 종류의 組織이나 細胞의 配列이 다를 것이고 또 倍率을 높게 하고 관찰하며는 여러가지 樣相이 나타날 것이 豫想된다. 이런 點을 감안할때 이제까지의 몇 研究觀察에도 不拘하고 몇가지의 새로운 知見을 얻은 目的으로 本研究를 企圖하였다.

材料 및 方法

1. 被囊幼蟲

肺吸蟲의 被囊幼蟲은 江原道 양양郡 현북면 어성전里에서 採集한 참가재(*Cambaroides similis*)의 筋肉内에서 分離하였다.

2. 實驗動物

體重 10kg 内外의 健康한 개를 암수의 구별없이 개 1마리당 肺吸蟲 被囊幼蟲 60個씩을 經口的으로 投與하였다.

被囊幼蟲을 投與한 후 4개월이 지나서 개를 屠殺하고 肺臟을 摘出하였다.

3. 觀察方法

肺吸蟲이 感染된 개의 肺臟으로부터 肺吸蟲 成蟲을 蒐集한 후 走査電子顯微鏡 또는 透過電子顯微鏡 觀察을 爲하여 다음과 같이 固定하였다.

走査電子顯微鏡 觀察을 위하여는 蟲體를 0.1M 인산완충액(pH 7.4)으로 한번 세척한 후 2.5% glutaraldehyde(pH 7.4)용액으로 4°C에서 3時間 固定하였다. 이것을 다시 0.1M 인산완충액으로 세척한 후 1% osmium tetroxide(pH 7.4)에 다시 1時間 30分 後固定한 후 ethanol로 脫水시켰다. 이것을 isoamylacetone에 처리하여 critical point dryer로 乾燥시킨 후 colloidal silver로 alminium stab에 부착시키고 JEC-1, 100 ion coater에서 200Å의 두께로 gold coating하였다. 觀察은 JSM-35C走査電子顯微鏡으로 15KV에서 實施하였으며 보다 仔細한 觀察을 위하여 蟲體를 切斷 或은 破壞시킨 경우도 있었다.

透過電子顯微鏡 觀察을 爲한 蟲體는 ethanol脫水乾燥까지는 走査電子顯微鏡 觀察時와 같은 方法으로 하였으며 ethanol脫水後에 Epon 812 mixture에 包埋하였다. 그 후 sorvall MT-2형 ultramicrotome으로 超薄切

* 本 論文은 1984年度 文教部 學術研究造成費의 支援으로 이루어진 것임.

片을 만들어서 uranyl acetate와 lead citrate로 二重染色을 한 후 JEM-100CXII透過電子顯微鏡으로 80KV하에서 觀察하였다.

成 績

1. 走査電子顯微鏡의 觀察

肺吸蟲 成蟲의 體表面은 表皮의 屈曲에 依한 많은 突起(knohs)들로 소위 자갈밭모양(cobble stone-like)의 구조로 되어 있었다. 그리고 皮棘(spine)들과 乳頭(papillae)들이 全體表에 突出하고 있었다. 蟲體의 前端部에는 口吸盤(oral sucker)이 있고 末端部에는 排泄孔(excretory pore)이 있으며 腹側面(ventral side)의 中央上部에 腹吸盤(ventral sucker)이 位置하고 있었다(Fig. 1 & 2).

皮棘은 끝이 하나였으며 體表面에 굳게 連結되어 蟲體의 後方을 向해서 突出하고 있었다. 口吸盤 및 腹吸盤의 表面도 다른 表皮와 같이 表皮突起로 이루어져 있었으며 吸盤의 隆起部位에는 他部位의 皮棘보다 작은 皮棘들이 密集되어 있는 것이 觀察되었다(Fig. 3 & Fig. 4). 이 微細皮棘들은 몇개씩 모여 있어서 끝이 여러개로 보이는 경우가 많았으며 口吸盤 및 腹吸盤의 内部에는 皮棘이 分布하지 않았다(Fig. 5). 또한 腹吸盤의 隆起部에 있는 微細皮棘은 口吸盤의 隆起部の 微細皮棘에 比하여 작았으며 또 腹吸盤주위의 皮棘들도 작았다.

乳頭는 表皮가 半球形으로 突出되어 이루어져 있었으며 中央에 1個의 짧은 纖毛(cilium)를 가지고 있는 것이 많았다. 乳頭는 한개가 單獨으로 존재하는 것과 몇개가 모여 있는 것, 그리고 여러개가 뭉쳐서 큰 융기를 形成하고 있는 것 등이 있었다. 口吸盤 및 그 周圍에는 다른 部位에 比하여 많은 數의 乳頭가 分布하고 있었으며 여러개가 뭉쳐서 큰 隆起를 이루는 것이 많았다(Fig. 3, 5, 6 & 7). 口吸盤 위에는 纖毛가 없이 表皮隆起만으로 이루어진 乳頭가 있는데 이들은 다른 體表에는 分布하지 않았다. 또한 다른 部位에 있는 乳頭보다 훨씬 컸다(Fig. 6). 口吸盤주위의 表皮에도 다른 部位에 比하여 많은 數의 乳頭가 觀察되었는데 3~7個의 작은 乳頭가 모여 있는 경우가 大部分이고 여러개가 뭉쳐서 큰 융기를 이루었고 單獨으로 있는 경우는 매우 드물었다(Fig. 8). 腹吸盤 위에는 口吸盤과 같이 纖毛가 없는 큰 乳頭가 있었으나 그 數가 口吸盤에서 보다 적었으며 여러개의 乳頭가 뭉쳐서 큰 융두를 이루는 경우는 볼 수 없었다. 腹吸盤 周圍의 表皮에도 많은 數의 乳頭가 있었는데 2~5개의 乳頭가 모여 있는 경우가 많았고 單獨으로 存在하는 乳頭도 觀察되었다(Fig. 10). 또한 微細皮棘이 있는 腹吸盤의 융기부에서는 纖毛가 있는 乳頭를 볼 수 없었다. 腹吸盤보다 아래部分은 윗部分에 比하여 乳頭의 數가 적었으며 大部分이 單獨으로 存在하고 2~3個의 乳頭가 모

여있는 경우가 있었다. 蟲體의 末端에 있는 排泄孔은 外部로의 開口는 보이지 않고 表皮가 不規則하게 engk여 있었으며 周圍에는 皮棘이나 乳頭가 比較的 적었다(Fig. 9, 11, & 12).

2. 透過電子顯微鏡의 觀察

肺吸蟲의 表皮는 比較的 電子密度가 높은 表皮層 tegument)으로 덮여 있으며 이 表皮層의 遊離表面과 基底面은 모두 原形質膜으로 形成되어 있었다. 이중 遊離表面은 屈曲을 이루어 走査電子顯微鏡上에서 관찰되는 表皮突起와 一致하였다. 表皮層의 두께는 관찰부위에 따라서 差異가 많았는데 一般的으로 腹側面의 口吸盤과 腹吸盤 사이의 表皮層이 두둑고 屈曲이 甚하였다(Fig. 13 & 16).

表皮層內에서 核을 觀察할 수 없었으며 多數의 絲粒體가 散在하고 있고 若干의 小胞體(endoplasmic reticulum)가 있었다. 또한 球形顆粒과 桿狀顆粒이 表皮層 全域에서 觀察되었고 空胞(vacuole)도 多數 存在하고 있었다(Fig. 14). 絲粒體는 表皮層 아래의 細胞에서도 많이 觀察할 수 있는데 大部分의 表皮層內의 絲粒體는 cristae가 잘 발달하고 比較적 작은 反面에 表皮層 아래의 細胞內에 있는 絲粒體는 cristae가 덜 발달하고 크기는 큰 편이었다(Fig. 14 & 15). 皮棘은 表皮層의 基底面의 原形質膜에서 부터 시작하여 外部를 向해서 突出되어 있는 無定型的의 構造物로서 電子密度가 높은 物質로 채워져 있었으며 表皮層의 遊離表面을 뚫지는 못하였다(Fig. 13 & 17). 한편 口吸盤 周圍의 表皮層內에서 神經體(nerve body)를 發見할 수 있었다. 이 神經體는 二重膜으로 둘러싸여 있는데 이 膜은 神經體內로 많이 陷入되고 있었으며 神經體内部에서는 많은 絲粒體와 二重膜으로 둘러싸인 表皮層物質을 觀察할 수 있었다(Fig. 17 & 18). 또한 表皮層의 遊離表面은 原形質膜의 바로 下部에 桿狀顆粒이 比較적 規則的으로 配列하고 있는 것을 많이 볼 수 있었다(Fig. 19). 表皮層 아래로는 基底面의 原形質膜에 連하여 基底膜(basement membrane)이 있고 그 아래에 膠樣纖維와 網狀纖維로 이루어진 疎性結合組織(loose connective tissue)이 있었다. 이 組織 다음에는 輪走筋束 및 縱走筋束이 筋肉層을 形成하고 있었고 그 아래에 유연조직내에 表皮細胞 tegument cell)가 자리잡고 있었다. 表皮細胞는 形態가 不規則하고 큰 球形 혹은 卵型的의 核을 가지고 있었으며 細胞質內에는 絲粒體와 顆粒이 많이 있고 小胞體와 golgi體는 잘 발달되지 않았는데 많은 表皮細胞가 表皮層과 비슷한 細胞質의 構造物을 가지고 있었다(Fig. 13 & 16). 그리고 表皮層과 表皮細胞는 原形質突起를 통하여 연결되고 있어서 基底面의 여러곳에서 原形質突起를 觀察할 수 있었다(Fig. 13, 16 & 21).

筋束은 그 内部에 잘 발달된 絲粒體를 包含하는 경우가 많았는데 1部의 筋束은 疎性結合組織內에 分布하여 基底膜과 dense body를 形成하고 있었는데 경우에 따라서는 基底膜과 筋束이 규칙적으로 dense body를

形成하는 것도 관찰되었다(Fig. 22 & 23). 筋束과 筋束 사이에는 神經軸索(nerve axon)이 많이 存在하고 있었는데 이 神經軸索은 Schwan's cell에 依하여 둘러싸여 있고 神經軸索內에서 絲粒體를 볼 수 있었다(Fig. 16, 24 & 25).

口吸盤의 表皮層은 매우 두터웠고 屈曲도 심하였으며 이에 比하여 腹吸盤의 表皮層은 얇고 平滑한 便이었는데 口吸盤이나 腹吸盤에서 모두 筋間層의 發達은 좋았다. 吸盤은 表皮層에 도너츠형으로 接하고 있는데 基底膜으로 둘러싸여 있었다. 이 吸盤을 둘러싼 基底膜은 外表의 基底膜과 外部에서 보이는 吸盤의 突出部에서 만나서 一個의 基底膜으로 合해져서 走査電子顯微鏡上의 吸盤內部와 이어지고 있었다. 또한 두 개의 基底膜이 合해지는 部位까지의 表皮層에서는 皮棘을 볼 수 있었으나 合해진 內部에서는 皮棘을 볼 수 없었다. 그리고 吸盤을 둘러싼 基底膜의 下部에는 잘 發達된 筋間層이 配列하고 있었고 그 아래에는 細胞가 있어서 吸盤도 他部位의 表皮와 같은 構成을 하고 있었다(Fig. 26 & 27).

考 察

吸蟲類 成蟲에 관한 電子顯微鏡的 觀察은 Senft들(1961)이 처음에 單子住血吸蟲에 對하여 報告한 바 外皮와 角皮, 그리고 그 下部에 基底膜이 있으며 그 사이에 小胞 및 空胞 등이 있었으며 基底膜에서 딱딱한 皮棘이 突出하고 있었다고 하였다. 그후 Lee (1966, 1972)에 의하면 肝蛭에서 表皮는 外層으로부터 原形質膜, 基底膜 및 筋層으로 이루어지고 表皮下層에 表皮細胞가 實質內에 있고 그 아래로 細胞性突起가 있다고 하였다. 그후 Sato들(1967)은 肺吸蟲의 精蟲形成課程을 電子顯微鏡의으로 관찰하여 보고하였고, 金鍾煥(1968)은 肝디스토마의 體表層의 微細構造를 관찰한 바 表皮가 原形質膜으로 덮여있고, 遊離表面이나 基底表面이 陷入되어 表面部를 擴大하고 있었다고 하였다. 더욱 基底의 表皮의 表層에 絲粒體와 2種 以上の 分泌顆粒이 있었고 筋束直下の 柔軟組織內의 表皮細胞의 核周圍細胞質에는 絲粒體, 分泌顆粒, 粗面小胞體, Golgi體, 遊離 ribosome들이 관찰되었다고 한다. 이같은 成績은 透過電子顯微鏡 觀察에 局限되고 走調電子顯微鏡的 觀察은 아니었다. 그후 Richard와 Franklin (1970)은 肺吸蟲의 組織像을 電子顯微鏡的으로, 그리고 Hockley (1970)는 單子住血吸蟲의 微細構造를, 또 Paul (1972)은 개구리의 肺吸蟲의 生殖器官을, 그리고 鄭啓憲들(1978)은 肝吸蟲의 微細構造에서 體表皮層의 두께가 中腹部가 背部의 2倍인 6 μ m에 이른다고 하였고 感覺毛가 主로 吸盤周圍에 많았다고 하였다. 그후 Fujino들(1979 a & b)은 肝吸蟲의 cercaria와 幼若蟲 및 成蟲의 表皮에 關하여 觀察하였으며 Fujino와 Ishii (1979)는 各種吸蟲類의 表皮構造를 比較한 바 있었다. 또 肥

後들(1980)은 肺吸蟲 cercaria의 體表微細構造를 走査電子顯微鏡으로 관찰한 바 2種의 皮棘과 cilia의 有無에 따른 2種의 乳頭를 보고하였다. 그후 李相文들(1981)은 肺吸蟲, 幼若蟲 및 成蟲表皮의 微細構造를 관찰한 바 成蟲의 表皮所見에서 皮棘의 끝이 하나인 點은 本實驗과 同一하였으나 本實驗에서는 口吸盤 周圍에서 다른 部位와 다른 多分歧된 皮棘과 뭉쳐있는 乳頭를 觀察할 수 있었고, 또 皮棘의 分布가 蟲體部位에 따라서, 보다 발달된 部分과 그렇지 않은 部分을 볼 수 있었던 點 등이 相異하였다. 透過電子顯微鏡的으로 本實驗에서는 基底膜이나 筋肉層 및 顆粒들 以外에 神經索(Axon), dense body 및 絲粒體 등을 觀察하였을 뿐 아니라 表皮層이 原形質膜, 基底膜 및 筋肉層 등을 지나서 下層에서 表皮細胞와 連結되고 있음을 發見하였다. 이같은 事實은 電子顯微鏡的으로 巨大한 蟲體를 部位別로 觀察하는데 따라서 觀察結果가 달라질 것으로 思料된다. 그후에 曲華星들(1982)과 이길자(1984)는 praziquantel이 肺吸蟲에 미치는 影響을 電子顯微鏡的으로 觀察한 바 走査電子顯微鏡으로는 蟲體의 表皮乳頭가 膨大하고 섬모가 消失되었으며 또한 皮棘基底部에도 역시 膨大가 일어났으며 部位에 따라서는 表皮의 缺損이 있었다고 하였다. 透過電子顯微鏡으로는 表皮層의 顆粒이 팽창하고 그 數가 增加하였으며 空胞가 增加하였다고 하였다.

要 約

1. 走査電子顯微鏡 觀察로 體表面은 屈曲에 依한 많은 突起로서 소위 자갈밭모양의 構造를 이루고 있었다. 皮棘들과 乳頭가 體表面에 突出하고 있었는데 皮棘은 끝이 하나로 되어있고 蟲體後方을 向해서 突出하고 있었다. 그중 口吸盤과 腹吸盤의 隆起部에 있는 皮棘은 작았으며 先端이 뿔갈래로 갈라져 있었고 또 密集되어 있었다.
2. 乳頭는 表皮가 半球形으로 突出하고 있었고, 中央에 하나의 纖毛를 가지고 있었으며 乳頭는 單獨이거나 또는 여러개가 모여 있는 것 또는 여러개가 뭉쳐서 큰 隆起를 이루고 있는 등 그 모양이 多樣하였다. 口吸盤이나 腹吸盤에 있는 乳頭는 他部位보다 매우 큰 乳頭가 있었고 여러개가 뭉쳐있는 것이 많았다.
3. 透過電子顯微鏡 觀察로는 表皮는 電子密度가 높은 表皮層으로 덮여있었고 表皮層의 遊離面과 基底面은 모두 原形質膜으로 싸여 있었다. 表皮層의 두께는 특히 口吸盤과 腹吸盤사이가 두터웠다. 表皮層內에는 絲粒體, 小胞體, 空胞 그리고 球形 및 桿狀顆粒이 관찰되었다.
4. 皮棘은 表皮層의 基底面의 原形質膜에서 시작하여 外部로 突出하였는데 電子密度가 매우 높은 無定型의 구조물로 되어 있었다. 또한 口吸盤의 周圍의 表皮層에서는 神經體가 발달되었다.

5. 表皮層 아래로 基底面의 原形質膜에 連해서 基底膜이 있고 그 아래로 疎性結合組織이 있고 그 아래로 筋肉層, 그리고 그 밑에 유연조직이 있으며 그 속에 表皮細胞가 있었다. 또한 이 表皮細胞와 表皮層은 電形質突起로 연결되고 있는 것을 볼 수 있었다.

參 考 文 獻

- Fujino, T. & Ishü, Y. (1979) Comparative ultrastructural topography of the gut epithelia of some trematodes *Int. J. Parasit.*, 9: 435-448.
- Fujino, T., Ishii, Y. & Choi, D.W. (1979 a) Surface ultrastructure of the tegument of *Clonorchis sinensis*-Newly excysted juveniles and adult worms. *J. Parasitol.*, 65: 579-590.
- Fujino, T., Ishii, Y. & Choi, D.W. (1979 b) The ultrastructural characterization of the tegument of *Clonorchis sinensis* (Cobbold, 1875) cercaria. *Z. Parasitenkd.*, 60: 65-76.
- Fukuda, K., Fujino, T. & Hamajima, F. (1982) Crystalline inclusions in the subtegumental cells of the adult lung fluke, *Paragonimus westermani*. *Z. Parasitenkd.*, 68: 235-238.
- 肥後廣夫, 藤野隆博, 石井洋一(1982) ウェステルマン肺吸蟲セルカリアの體表微細構造, 日寄生蟲誌, 29: 399-408,
- Higo, H. & Ishii, Y. (1984) Scanning electron-microscopy of the newly excysted juveniles, *Paragonimus westermani* (Kerbert, 1878) Braun, 1899 (Parthenogenetic type) and *P. miyazakii* Kamo, Nishida, Hatsushida and Tomimura, 1961. *Jap. J. Parasitol.*, 33: 421-427.
- Hokley, D.J. (1970) An ultrastructural study of the cuticle of *Schistosoma mansoni* Sambom, 1907. Ph. D. Thesis, University of London.
- 鄭啓憲, 林漢鍾, 金昌漢(1978) 肝吸蟲의 微細構造에 關한 研究 1. 表皮層 및 神經系. 기생충학잡지, 16: 156-164.
- 金鍾煥(1968) 肝디스토마(*Clonorchis sinensis*) 體表層의 微細構造에 關한 研究. 기생충학잡지, 6: 111-122.
- 曲華星, 金洙鎮, 林漢鍾(1982) Praziquantel이 肺吸蟲에 미치는 影響에 關한 電子顯微鏡的 研究. 高醫大論文集, 19: 617-630.
- Lee, D.L. (1966) Cited from *Advances in Parasitology* ed. Ben Dawes Vol. 4, p.188-202, London and New York. Academic Press.
- Lee, D.L. (1972) Cited from *Advances in Parasitology*, B. Dawes Vol. 10, p.347-372. London and New York. Academic Press.
- 이길자(1984) Praziquantel의 影響에 對한 폐흡충(*Paragonimus westermani*)의 전자현미경적 관찰. 가톨릭대학의학부 논문집, 37: 433-455.
- 李相文(1981) 肺吸蟲幼若蟲 및 成蟲表皮의 微細構造. 中央醫大誌, 6: 579-590.
- Paul, R.B. (1972) Fine structure of reproductive system of a frog lung fluke. III. The spermatozoon and its differentiation. *J. Parasitol.*, 58: 68-83.
- Richard, D.L. & Franklin, S.B. (1970) Ultrastructural manifestations of pulmonary paragonimiasis. *J. Parasitol.*, 56: 1,095-1,109.
- Sato, M., Oh, M. & Sakada, K. (1967) Electron microscopic study of spermatogenesis in the lung fluke (*Paragonimus miyazakii*) *Zeitschrift für Zellforschung*, 77: 232-243.
- Senft, A.D., Philott, D.E. & Pelofsky, A.H. (1961) Electron microscope observations of the integument, flame cells and gut of *Schistosoma mansoni*. *J. Parasitol.*, 47: 217-229.

=Abstract=

Ultrastructure of the Integument of Adult *Paragonimus westermani*

Won-Young Choi and Jae-Eul Yoo

Department of Parasitology, Catholic Medical College, Seoul, Korea

The present study was performed to observe the ultrastructure of the integument of adult *Paragonimus westermani*.

Dogs experimentally infected with 60 metacercariae of *P. westermani* were autopsied 4 months after the infection. Adult *P. westermani* were extracted from the dogs and the fine structure was studied by means of scanning and transmission electron microscope.

The findings are as follows:

1. Scanning electron microscopic findings showed that the spines and the papillae are distributed at whole body surface but the well developed spines or papillae are shown around the oral sucker and ventral sucker.
2. At the end of the body, excretory pore was found, the shape was irregular.
3. Transmission electron microscopic findings showed that plasma membrane, tegument, basal lamina, connective tissue, circular muscle layer, longitudinal muscle layer, nerve axon and tegumental cell were observed.
4. In higher magnification, plasma membrane and bar-shaped granules were found at the outer surface of the tegument.

EXPLANATION OF FIGURES

I. Scanning electron microscopic findings

- Fig. 1.** Ventral view of the worm, showing the oral sucker (VS) ($\times 60$).
Fig. 2. Dorsal view of the worm, showing the oral sucker (OS) ($\times 60$).
Fig. 3. Fine spines and papillae (P) are noted around the oral sucker ($\times 180$).
Fig. 4. Small and fine spines and papillae are noted around the ventral sucker ($\times 160$).
Fig. 5. Small branched spines and aggregated papillae are noted in inner side of the oral sucker ($\times 2,000$).
Fig. 6. Several papillae are noted around the oral sucker ($\times 4,200$).
Fig. 7. Well developed spines and papillae are noted below the oral sucker ($\times 1,540$).
Fig. 8. Several papillae are aggregated around the oral sucker ($\times 330$).
Fig. 9. & Fig. 10. Poorly developed papillae are aggregated around the ventral sucker (Fig 9: $\times 2,000$, Fig. 10: $\times 600$).
Fig. 11. Well developed large papillae (P) are noted around the excretory pore ($\times 1,200$).
Fig. 12. Excretory pore (EP) is noted at lower part of the worm ($\times 900$).

II. Transmission electron microscopic findings

- Fig. 13.** Showing the cross-sectioned spine (SP), muscle (M) and tegument nucleus (N) in tegumental syncytium in ventral side of worm between oral sucker and ventral sucker ($\times 12,000$).
Fig. 14. Well developed mitochondria (M), endoplasmic reticulum (ER), rod-shaped granule (G) and fine vacuole are noted in tegumental syncytium ($\times 10,000$).
Fig. 15. Higher magnification of mitochondria (M) ($\times 27,000$).
Fig. 16. Well developed muscle (M) and thin tegumental layer are noted in dorsal side of the worm ($\times 17,600$).
Fig. 17. Nerve body (NB), sectioned spine (SP), basal lamina (BL) and connective tissue (CT) are noted in tegumental syncytium near the oral sucker ($\times 8,000$).
Fig. 18. Higher magnification of nerve body (NB) ($\times 20,000$).
Fig. 19. Plasma membrane (PM) is covering the outer tegument and bar-shaped granules are noted below the layer ($\times 54,000$).
Fig. 20. Structures below the tegument; muscle (M), connective tissue (CT), basal lamina (BL) and plasma membrane (PM) are noted ($\times 54,000$).
Fig. 21. Tegumental communication is noted from outer tegumental layer to inner tegumental cell ($\times 54,000$).
Fig. 22. Inner side of the tegumental syncytium ($\times 6,500$).
Fig. 23. Higher magnification of Fig. 22, showing the plasma membrane (PM), basal lamina (BL), connective tissue (CT), circular muscle (M) and dense body (D) ($\times 17,500$).
Fig. 24. & Fig. 25. Higher magnification of mitochondria (Mt). They have double membranes ($\times 7,000$ & $\times 26,000$).
Fig. 26. Sectioned tegumental syncytium (Tg), spine (SP), basal lamina (BL), and muscle (M) are noted. ($\times 2,000$).
Fig. 27. Higher magnification of Fig. 26., basal lamina (BL) and connective tissue are noted between the spine (SP) and muscle layer (M) ($\times 36,000$).

*Abbreviation of figures

OS : oral sucker	VS : ventral sucker
P : papillae	EP : excretory pore
SP : spine	Tg : tegument
ER : endoplasmic reticulum	V : vacuole
M : muscle	G : granule
A : nerve axon	BL : basal lamina
CT : connective tissue	Mt : mitochondria
D : dense body	N : tegumental nucleus