免疫黃金標識法을 이용한 肺吸蟲의 幼若成蟲 組織內 抗原性 部位에 관한 研究

高麗大學校 醫科大學 寄生蟲學敎室 및 熱帶風土病研究所, 翰林大學校 生物學科*

權五成 · 李駿商 · 林漢鍾 · 金洙鎮*

요 약 : 폐흡충(*Paragonimus westermani*)에 감염된 숙주에 대해 抗體 생성을 유도하는 물질이 분포하고 있는 부위를 확인하기 위하여 대조군의 IgG와 폐흡충에 감염된 실험 개의 특이 IgG를 폐흡충 幼若成蟲 組織에 반응시키고 免疫黃金標識法을 이용하여 전자현미경으로 관찰하여 다음과 같은 결과를 얻었다.

대조군의 IgG를 반응시킨 幼若成蟲 표피층은 표피세포에서 분비되는 물질이 포함된 표피 합포체로 구성되어 基底層과 분명하게 구별되었으며 筋肉層도 잘 발달되어 있었다. 卵黃細胞는 크기가 다양한 分泌顆粒 등을 포함하고 있었으며 특히 조면소포체가 발달되어 있었다. 盲管의 膜構造物은 잘 발달되었으며 장상피 합포체도 잘 발달되어 있었다. 한편, 폐흡충에 감염된 실험동물의 특이 항체로 반응시킨 幼若成蟲 표피층의 표피 합포체와 표피세포의 細胞質에 황금입자의 매우 특이적인 標識가 관찰되었고 卵黃細胞에서는 分泌顆粒에 황금 입자가 높은 밀도로 관찰되었다. 그리고 盲管 上皮 합포체는 미약하게 황금 표지가 되었고 盲管 膜構造物과 盲管 內腔에도 특이하게 황금 표지가 관찰되었지만 표피 합포체와 표피세포보다 밀도가 낮게 관찰되었다.

이상의 결과로 폐흡충에 감염된 실험 개는 폐흡충의 표피 합포체와 표피세포에서 생성된 물질과 卵黃細胞에서 생성된 물질에 의하여 免疫抗體가 형성되며 일부는 盲管 內容物에 의해 약간의 免疫抗體가 유도되는 것으로 생각되었다.

Key words: *Paragonimus westermani*, antigenic localization, immunogold labeling, ultrastructure, dog

緒 論

폐흡충에 감염된 숙주에서 免疫抗體가 검출된다는 사실은 이미 많은 연구 보고에 의해 알려졌다(Yokogawa *et al.*, 1962; Yogore *et al.*, 1965; 崔 및 李, 1981; Cho *et al.*, 1981; 李 및 張, 1986). 숙주로부터 폐흡충 감염 여부를 확인하기 위한 면역학적 진단법으로 최근에 Joo *et al.* (1989)은 immunoblot법을 이용하여 충체를 구성하는 특정 단백질을 확인하였으며 Choi *et al.* (1975)과 Cho and Soh (1976) 등은 間接螢光標識法으로 충체 조직의 숙주 抗體에 대한 항원성 소유 여부를 확인하여 보고한 바 있었다. 폐흡충 충체가 숙주에 감염되어 성숙하는 과정에서 감염 후 8주부터 폐흡충 조직을 구성하는 단백질 양상이 변화하며(Huer *et al.*, 1985), 폐흡충에 대한 숙주의 抗體 생성은 폐흡충에 감염된 고양이 血清에서 抗體의 ELISA 값을 측정한 결과 특이 항체의 증가는 감염 후 16주에 최대값을 갖는다는 보고가 있었다(李 및 張, 1986).

최근에는 成 등(1988)과 朱 등(1990)이 免疫黃金標

識法을 이용하여 간흡충의 조직항원성을 보고한 바 있었다. 成 등(1988)은 간흡충의 경우 감염된 숙주의 免疫抗體와 반응하여 항원성을 나타내는 충체의 부위는 盲管의 내용물과 盲管 上皮 그리고 충체의 체액성 물질이 주로 강한 免疫反應을 일으킨다고 보고하였다. 간흡충에 감염되었을 때 간흡충이 배설한 맹관 내용물과 간흡충의 분비물은 간흡충의 기생부위인 膽道를 통하여 배설되어 특정 물질이 숙주에 흡수되면 숙주의 면역계 세포에 인식되어 숙주가 免疫抗體를 형성하게 되는 것으로 보고하였다.

그러나 폐흡충의 경우 기생부위가 간흡충과는 상이하므로 많은 부분의 물질대사가 상이할 것으로 생각되며 이들에 대한 항원성 부위 역시 많은 상이점이 있을 것으로 생각된다. Sugiyama *et al.* (1987)과 이 등(1989)은 폐흡충의 충체에서 抗體와 반응하는 부위를 확인하기 위하여 免疫組織化學의 方法을 이용하여 충체의 각 부위 특정 組織組化原을 확인한 결과 충체의 배설물과 충란 주위에서 항원성이 강하게 나타나는 것으로 보고하였다. 그러나 전자현미경을 이용한 폐흡충(*P. westermani*) 조직 세포의 미세구조상에서 항원성

을 갖는 물질이 존재하는 부위에 관한 연구 보고는 없었다.

본 실험에서는 폐흡충 충체의 조직세포가 포함하는 물질이 숙주의 항체에 대한 항원성을 나타내는 정도와 항원성 물질의 충체 조직 세포내 분포를 확인하기 위하여 組織抗原으로 폐흡충 충체를 사용하였다. 특히 충체의 단백질 양상이 복잡해지기 전 발육단계에 있는 幼若成蟲을 조직 항원으로 사용하였고 항체는 실험동물이 폐흡충 被囊幼蟲에 감염되어 혈청내 항체값이 최대가 되는 감염 후 16주의 실험동물 혈청에서 분리한 IgG(免疫抗體)를 사용하였다. 그리고 폐흡충 組織抗原에 실험동물 IgG를 免疫反應시켜 免疫黃金 粒자를 標識하여 전자현미경으로 관찰하고 폐흡충 조직내 抗原部位와 이들 충체 抗原部位에 따른 조직세포가 포함하는 물질의 항원성을 비교 검토함으로써 폐흡충이 숙주에서 抗體를 유도하는 물질이 무엇인가를 규명하고자 하였다.

實驗材料 및 方法

1. 實驗材料

폐흡충 충체를 얻기 위하여 체중 1kg의 실험 고양이를 2마리에 참가재(*Cambaroides similis*)로부터 분리한 폐흡충 被囊幼蟲을 30개씩 각각 경구 감염시키고 4주 후에 고양이를 부검하여 肺組織에서 폐흡충의 幼若成蟲을 얻었다.

IgG(免疫抗體)를 얻기 위하여 참가재로부터 분리한 폐흡충 被囊幼蟲을 체중 10kg의 실험 개 5마리에 경구 감염시키고 16주 후에 개로부터 血清을 분리하였다.

2. 實驗方法

肺吸蟲 組織抗原: 실험 고양이로부터 얻은 폐흡충 幼若成蟲을 1% paraformaldehyde와 1% glutaraldehyde 고정액(pH 7.4)에 2시간 前固定하고 0.12 M phosphate buffer(pH 7.4)에서 洗滌하였다. 前固定된 충체들은 2% osmium tetroxide 고정액에 1시간 30분간 後固定하고 alcohol 탈수 후에 Lowicryl HM 20 mixture에 처리하고 60°C oven에서 24시간 포매하였다. 포매된 충체는 Reichert-Jung ultramicrotome으로 切片을 만들어 免疫反應의 組織 抗原으로 사용하였다.

免疫抗體: 폐흡충을 감염시키고 16주에 실험 개에서 분리한 혈청과 폐흡충에 감염되지 않은 실험 개 혈

청을 각각 saturated ammonium sulfate로 처리하고 Sorvall ultracentrifuge A 841 rotor 15,000 rpm으로 30분간 초원심분리하여 침전시킨 후 0.02 M과 0.005 M tris buffer(pH 7.4)로 투석하여 IgG를 얻었으며 이들 IgG를 免疫反應에서 1차 免疫抗體로 사용하였다. 黃金標識 抗體는 직경 12 nm인 黃金 粒子(colloidal gold) 용액에 0.05% protein A 용액을 첨가하여 초원심분리하여 제작한 黃金標識 蛋白質 A 複合體(protein A gold complex)를 免疫反應에서 2차 免疫抗體로 사용하였다.

免疫反應: Roth(1982 a & b)와 Kim *et al.*(1987 & 1988) 및 成 등(1988) 그리고 朱 등(1990)의 방법에 따라 grid에 부착된 폐흡충 조직 절편을 saturated sodium metaperiodate에 처리한 다음 0.02 M tris buffer(pH 8.2)로 洗滌하여 실험동물의 IgG를 tris buffer와 1:100으로 희석하여 각각 반응시켰다. 실험동물 IgG와 반응시킨 grid와 조직 절편은 protein A gold complex-용액에 반응시킨 후 0.02 M tris buffer(pH 8.2)와 증류수로 洗滌하고 uranyl acetate와 lead citrate로 이중 염색하고 전자현미경으로 관찰하였다. 충체의 조직 0.1 μm^2 당 黃金 粒子的 數를 계산하여 충체의 조직 세포에 반응한 黃金 粒子的 數로 免疫反應의 정도를 비교하였다.

實驗成績

1. 對照群 실험 개(犬)의 IgG 반응 결과

폐흡충의 표피 합포체 tegumental syncytium)는 충체 외부로 表皮隆起 tegumental ridge)를 형성하고 합포체를 구성하는 원형질층에는 크기가 다양하고 크리스테(cristae)가 발달되지 않은 미토콘드리아(mitochondria)와 盤狀 혹은 棒狀의 분비 과립들과 전자밀도가 높은 皮棘들로 구성되어 있었다.

皮棘은 基底層의 기저막(basement membrane)에서부터 시작하여 표피 합포체를 통과하여 외부로 돌출하고 전자밀도가 높은 물질들이 균일하게 구성되어 있었다.

基底層(basal lamina)은 합포체層과 筋肉層을 분리시키며 0.6 μm 의 層을 형성하고 있었으며 基底層은 전자밀도가 낮은 물질들로 구성되어 있었고 표피세포의 원형질 突起 tegumental cell cytoplasmic process)와 표피 합포체 사이의 연결 부위는 基底層이 분리되어 관찰되었다. 基底層과 연결하고 있는 근육층은 環狀筋

(→)

Fig. 1. Electron micrograph of the tegument of a worm which was reacted with dog IgG from noninfected control showed the tegumental syncytium(TS), basal layer(BL), circular muscle(CM) layer, longitudinal muscle(LM) layer, interstitial matrix(IM) and tegumental cell cytoplasm(TCC). Gold particles were not labeled on the tegument or other portions of the tissue. Bar=1 μm ($\times 17,000$)

Fig. 2. The tegumental tissue of the worm reacted with specific antibody(IgG) from infected dog. Gold particles were specifically labeled in the tegumental syncytium and cytoplasm of the tegumental cell. Bar=1 μm ($\times 28,000$)

(circular muscle)과 縱走筋(longitudinal muscle)이 배열되어 있으며 筋肉層 사이로 부분적으로 표피 세포 원형질突起가 통과하고 있었다. 縱走筋과 環狀筋 사이에 부분적으로 棒狀의 미토콘드리아가 밀집하여 분포하고 있는 표피 세포 원형질과 전자밀도가 낮은 물질로 구성된 세포간질(interstitial matrix)이 관찰되었다(Fig. 1).

표피세포의 원형질에는 많은 미토콘드리아가 포함되어 있었고 핵소체가 명확하지 않은 유형의 세포도 관찰되었다. 한편 핵소체가 잘 발달되고 다수의 미토콘드리아와 조면 소포체(rough endoplasmic reticulum)와 골지 복합체(golgi complex)를 포함하고 있는 세포들도 관찰되어 그 종류가 명확하게 구별되었다. 핵소체가 잘 발달된 표피 세포는 직경 $1\ \mu\text{m}$ 의 핵소체가 구형으로 관찰되며, 핵 역시 직경 $3.5\ \mu\text{m}$ 의 구형으로 핵막이 잘 발달되어 있었다. 그리고 원형질에는 표피 합포체의 주 구성물인 盤狀, 棒狀 顆粒들로 채워져 있었으며 이들 원형질 물질들은 표피 합포체와 연결된 원형질突起에도 채워져 있는 것이 관찰되었다(Figs. 1 & 3).

筋肉層과 표피 세포 사이 그리고 표피 세포들 사이에는 細胞間質(interstitial matrix)이 관찰되었으며 세포간질은 표피 세포 주변의 유조직 세포들 사이에 특히 잘 발달되어 있는 점이 관찰되었다. 細胞間質은 전자밀도가 낮은 부분과 미소과립을 포함하는 부분 그리고 미토콘드리아가 집약되어 있는 부분으로 구별되었으며 부분적으로는 유조직세포의 세포막으로 세포의 구획이 나타나는 것이 관찰되었다(Figs. 1 & 3).

卵黃腺은 筋層과 基底層에 의하여 유조직과는 구별이 가능하였으며 여러 개의 卵黃細胞들로 구성되었다. 난황세포들은 크기가 다양하고 전자밀도가 높은 분비과립들을 포함하고 있었다. 핵소체와 핵막이 잘 발달되어 있었으며 특히 조면 소포체는 분비과립들 사이로 잘 발달되어 세포질의 대부분을 차지하고 있었다(Fig. 5).

盲管은 盲管 上皮層과 막구조물인 盲管 上皮膜層(cecum epithelial lamellae)으로 구성되어 있으며 막구조물들은 상피층에서 盲管 內腔으로 돌출하여 발달되어 있었으며 크기와 전자밀도가 다양한 盲管內 소화물질들이 부분적으로 관찰되었다. 盲管 上皮層은 합포체 부분과 筋肉層 그리고 盲管 上皮細胞層으로 구별되고 細胞間質은 부분적으로 잘 발달되어 있었다. 세포질은 전자밀도가 낮은 물질로 구성된 부분과 미소과립을 포함하는 부분 그리고 미토콘드리아가 밀집한 부분들이 원형질 膜에 의하여 나누어져 관찰되었다(Fig. 7).

2. 肺吸蟲에 감염된 실험 개(犬)의 IgG 반응 결과

폐흡충의 被囊幼蟲을 분리하여 실험 개에 經口 感染시키고 16주 후에 개의 혈청을 얻어 IgG를 분리하였다. 이들 IgG를 실험 고양에서 얻은 폐흡충 幼若成蟲 組織 抗原에 반응시킨 결과 표피 합포체 $0.1\ \mu\text{m}^2$ 당 78 ± 8 개의 황금 입자가 관찰되어 표피 합포체가 특이한 免疫反應이 일어나는 것으로 관찰되었다. 표피 합포체는 皮棘과 미토콘드리아 그리고 盤狀 및 棒狀의 과립들로 구성되어있으며 이들 중 皮棘과 미토콘드리아에는 황금 입자가 비특이적으로 반응함이 관찰되었지만 盤狀 및 棒狀 과립층에는 매우 특이적 免疫反應으로 관찰되었다(Table 1, Fig. 2).

基底層과 筋肉層은 황금 입자가 관찰되지 않았으나 기저층과 근육층으로 통과하는 표피 세포의 원형질突起에는 표피 합포체와 동일한 황금 입자의 수가 관찰되었다(Table 1, Fig. 2).

筋肉層 사이의 細胞間質(interstitial matrix)에는 황금 입자가 관찰되지 않았으며 표피 세포중 일부도 역시 황금 입자의 표지가 되어있지 않은 것으로 관찰되었다(Table 1, Figs. 2 & 4).

그러나 표피세포 중 원형질突起가 표피 합포체와 연결되고 원형질의 구성물질이 표피 합포체와 동일한 분비과립을 포함하는 표피세포에는 매우 특이한 免疫反應이 관찰되었다. 이들 표피 세포의 세포질에는 $0.1\ \mu\text{m}^2$ 당 황금 입자의 數가 81 ± 7 개로 표피 합포체와 동

Table 1. Quantitative density of the labeled gold particles in the tissues of *P. westermani* reacted with antibody (IgG)* obtained from dogs infected with *P. westermani*

Tissues	Mean No. gold particles/ $0.1\ \mu\text{m}^2$
Tegumental syncytium	78 ± 8
Basal lamina	1 ± 1
Tegumental cell cytoplasm	81 ± 7
Interstitial matrix in parenchyma	1 ± 1
Secretory granule in the vitelline gland	22 ± 3
Epithelial syncytium of caeca	4 ± 1
Epithelial lamellae and lumen areas in the caeca	8 ± 2
Interstitial matrix of caecal epithelium	1 ± 1

* Dog IgG were collected at 16 weeks after experimental infection with *P. westermani* metacercariae.

(←)

Fig. 3. The tegumental cell of the tegument reacted with control group dog IgG from infected control. Gold particle was not labeled on the cytoplasm of the cell. Bar= $1\ \mu\text{m}$ ($\times 17,000$)

Fig. 4. The tegumental cell of the tegument reacted with specific antibody (IgG) from infected dog. Specific label was present in the cytoplasm of the tegumental cell. Bar= $1\ \mu\text{m}$ ($\times 17,000$)

일한 정도의 황금 입자가 표지되어 표피 합포체의 구성 성분이 이들 표피세포와 연관이 있는 것으로 관찰되었다. 柔組織의 세포 중에는 미토콘드리아를 많이 포함한 세포와 核물질 중 핵소체가 명확하지 않은 세포는 황금 입자의 표지가 관찰되지 않았다. 뿐만 아니라 柔組織 중에서 세포 간질은 $0.1 \mu\text{m}^2$ 당 1 ± 1 개 정도의 황금 입자가 비특이적으로 반응한 것이 관찰되었다 (Table 1, Fig. 4).

卵黃腺을 구성한 세포는 분비 과립의 크기가 다양한 卵形으로 관찰되었으며 이들 분비 과립에는 $0.1 \mu\text{m}^2$ 당 22 ± 3 개의 황금 입자가 관찰되어 특이적 免疫反應이 나타난 것으로 관찰되었다. 조면 소포체(RER)가 잘 발달한 卵黃細胞의 세포질 내의 轉移小囊(transitional vesicle)에도 황금 입자가 적은 數이지만 표지된 것이 관찰되었다(Table 1, Fig. 6).

盲管의 上皮膜 구조물은 盲管 內腔으로 향하여 돌출되어 있었으며 부분적으로 망상 구조를 형성하지만 대부분이 돌출한 형태로 관찰되었다. 그리고 돌출된 盲管膜 구조물과 盲管 內腔 $0.1 \mu\text{m}^2$ 당 8 ± 2 개의 황금 입자가 관찰되어 비교적 특이하게 免疫反應이 나타난 것으로 관찰되었다(Table 1, Fig. 8). 막 구조물이 돌출한 盲管 上皮층에는 $0.1 \mu\text{m}^2$ 당 4 ± 1 개의 황금 입자가 관찰되었다. 盲管 上皮層의 基底層과 筋肉層에는 황금 입자의 표지가 관찰되지 않았으며 盲管 주위의 柔組織內 細胞間質에는 $0.1 \mu\text{m}^2$ 당 1 ± 1 개의 황금 입자가 관찰되어 매우 미약한 免疫反應이 폐흡충 組織 抗原에 대하여 나타나는 것으로 관찰되었다(Table 1, Fig. 8).

考 察

폐흡충에 감염된 실험 개에서의 抗體 형성은 Kim *et al.* (1982)과 최 등(1986)이 ELISA법으로 측정한 바 감염 후 3주부터 6주 사이에 抗體가 형성되기 시작하며 12주에서 18주 사이에 최고치에 이른다고 하였다. 따라서 본 실험에서 免疫反應에서 1차 抗體로 사용된 실험 개의 IgG는 폐흡충 被囊幼蟲을 감염시킨 후 16주에 血清을 얻어 IgG를 분리하였다.

폐흡충의 미세구조를 전자현미경으로 관찰한 李 (1981)와 Fukuda *et al.* (1982) 그리고 曲 등(1982)은 표피층에 많은 分泌顆粒과 皮棘 그리고 미토콘드리아를 포함하는 표피 합포체와 基底層 및 筋肉層과 표피 세포층으로 구별된다고 하였다.

본 실험에서도 대조군 개의 IgG와 감염된 개의 IgG를 幼若成蟲 組織 抗原에 반응시킨 결과 폐흡충 幼若成蟲의 미세구조가 표피층과 근육층 그리고 표피 세포층으로 명확하게 관찰되었다.

최 등(1986)에 의하면 폐흡충의 배설 항원에 대한 ELISA 값이 최대로 나타나는 것으로 보고하면서 分泌排泄 抗原은 표피의 分泌體(secretory body)나 탈락 표피세포 등 표피에서 빠져나오는 성분이며 이들은 표피를 구성하는 단백질일 것으로 추측된다고 하였다. 그러나 Kim *et al.* (1982)은 分泌排泄 抗原이 충체 표피보다는 충체의 排泄 抗原일 것으로 보고하였다. 이 등(1989)은 酵素發色法으로 관찰한 결과 충체 표피에서는 특이 항체에 대한 항원의 반응이 나타나지 않아 표피가 항원일 가능성을 인지하지 못하였다.

이와 같은 실험 결과를 근거로 하여 전자현미경적으로 항원의 분포를 관찰한 본 실험에서는 충체의 표피를 구성하는 分泌顆粒에 매우 특이한 免疫反應이 나타나 최 등(1986)이 추측한 표피 分泌體(secretory body)가 이들 표피 합포체의 分泌 顆粒(secretory granule)으로 생각되었으며 충체 표피가 숙주의 조직과 접촉하는 폐흡충의 경우 표피 합포체가 항원성이 가장 높은 것으로 생각된다.

폐흡충의 표피를 구성하는 표피 합포체의 分泌顆粒에 관한 연구에 있어서 Fujino *et al.* (1989)에 의하면 *Paragonimus ohirai*에서 충체의 성숙 시기에 따라 과립의 형태가 변하며 monoclonal antibody를 사용한 황금 표지법에서 확인한 결과 특정 표피세포에서 합성되어 일정기간 표피 합포체로 이동되고 있음을 확인하였다고 하였다.

본 실험에서는 폐흡충의 幼若成蟲 組織 抗原에 감염된 실험 개의 IgG를 사용하였다. 이들 IgG는 polyclonal antibody이므로 특정 顆粒에 황금 입자가 표지되지 않고 표피 합포체의 모든 顆粒에 표지되었다. 따라서 폐흡충에 감염되면 숙주에게 免疫反應을 유발하는 물질은 표피 합포체의 주 구성 성분인 여러 종류의 分泌顆粒들이며 이들 分泌顆粒들은 표피세포에서 합성되어 표피 합포체로 전이되어 表皮隆起에서 분비되면 숙주에게 흡수되어 숙주에 免疫反應을 유발하는 물질로 작용할 것으로 생각되었다.

폐흡충의 감염 여부를 확인하는데 Sawada *et al.* (1964)과 Imai (1979) 그리고 Joo *et al.* (1989)이 粗抗原을 가지고 精製抗原(purified antigen)을 제작하여 抗原으로 사용하고 抗體인 숙주의 血清을 반응시키는

(→)

Fig. 5. The vitelline gland of a worm which was reacted with control group dog IgG from noninfected control. Gold particles were not labeled on the cytoplasm and secretory granules of vitelline gland cell. Bar= $1 \mu\text{m}$ ($\times 28,000$)

Fig. 6. The vitelline gland of a worm which reacted with specific antibody(IgG) from infected dog. Gold particles were very specifically labeled on the secretory granules of vitelline gland cell cytoplasm. Bar= $1 \mu\text{m}$ ($\times 28,000$)

방법을 사용하였으며 이는 단백질의 분자량에 따라 특이 반응이 나타난다고 하였다. 이는 주로 수용성 단백질을 분리하여 抗原으로 사용한 것이었다. 그러나 본 실험에서는 組織 抗原을 사용하였으므로 총체의 조직에 함유된 모든 단백질에 대하여 항원성을 확인하는 방법이다. 따라서 抗原 정제시에 용매의 종류에 따라 항원물질이 선택적으로 용해되는 경우를 생각하지 않아도 되는 장점이 있고 抗原 抗體 特異反應이 보다 정확하고 쉽게 관찰될 것으로 생각된다. 이 연구의 결과로 미루어 보면 蟲體의 표피 합포체가 특이한 免疫反應이 나타나므로 표피 조직만을 抗原으로 사용할 경우에 진단적 가치를 평가할 필요가 있을 것으로 생각된다.

朱 등(1990)은 간흡충 조직에 간흡충 체액을 면역시킨 免疫抗體를 반응시켜 황금 입자를 표지한 보고에 의하면 卵黃細胞의 卵黃 分泌 顆粒에 免疫反應이 특이하게 나타나는 것으로 보고하였으며 이 등(1989)은 폐흡충 절편을 抗原으로 사용하여 폐흡충 감염 후 얻은 血清을 반응시켜 酵素 發色法으로 반응한 결과 총란에서도 특이적 免疫反應이 관찰되었다고 하였다.

본 실험에서도 폐흡충 蟲體 抗原에 폐흡충에 감염된 실험 개의 IgG를 반응시키고 황금 입자를 표지한 결과 卵黃細胞의 分泌 顆粒에 매우 특이적 免疫反應이 관찰되었다. 따라서 이들 卵黃細胞가 포함하고 있는 分泌 顆粒이 폐흡충에 감염된 숙주에게 免疫抗體 생성을 유도하는 것으로 생각되며 특히 卵黃細胞의 分泌 顆粒은 蟲卵 형성에 사용되는 卵黃物質이므로 총란의 난황물질에 대하여 항체 반응이 나타나는 것으로 사료되었다.

김 등(1990)은 폐흡충의 수용성 체액 성분을 실험 토끼에 주입하여 얻은 면역항체를 폐흡충 幼若成蟲 조직 항원에 반응시킨 결과 卵黃細胞의 分泌 顆粒에 특이적 免疫反應이 나타나는 것을 보았다. 따라서 卵黃細胞의 分泌 顆粒은 수용성 물질들에 포함되어 있으며 이들의 分泌 顆粒들은 폐흡충이 감염되었을 때나 體液 成分을 분리하여 면역시켰을 때 동일하게 숙주에게 免疫抗體 생성을 유도하는 물질일 것으로 생각되었다.

Kim et al.(1986)은 폐흡충 蟲卵 抗原은 폐흡충 成蟲 抗原에 비하여 그 항원성이 미약한 것으로 보고하였다. 이는 본 실험의 결과에서 卵黃細胞의 分泌 顆粒들이 매우 특이한 반응을 한 것과 다소 상이하지만 卵黃細胞의 分泌 顆粒이 蟲卵 형성에 다소 단백질의 分子構造의 變異가 초래될 것으로 생각될 뿐만 아니라 蟲體 抗原은 표피층을 비롯한 폐흡충 조직내 포함된

물질들의 항원성을 포함하고 있으므로 卵黃의 항원성은 蟲體 抗原에 비하여 항원성이 미약할 것으로 생각되었다.

成 등(1988)과 朱 등(1990)은 간흡충에 감염되어 생성된 실험 토끼의 抗體는 卵黃細胞의 分泌 顆粒에 항원성은 관찰되지 않았다고 하였지만 폐흡충의 경우에는 김 등(1990)의 폐흡충 體液 抗原에 대한 抗體에서 항원성을 나타내었으며 본 실험에서 폐흡충 감염에 의한 抗體에 대하여도 항원성이 나타났으므로 폐흡충과 간흡충의 卵黃腺의 卵黃細胞 分泌 顆粒이 숙주에게 免疫抗體를 유도하는 과정이 상이할 것으로 생각되었다.

吸蟲類의 盲管에 존재하는 물질과 盲管 膜 構造物의 항원성에 관한 연구는 Sun & Gibson(1969)과 成 등(1988) 및 朱 등(1989)은 간흡충(*Clonorchis sinensis*)의 盲管에 항원성이 있는 것으로 보고하였으며 Nash(1974)와 Lichtenberg et al.(1974) 그리고 De Water et al.(1986)은 만손 주혈흡충(*Schistosoma mansoni*)에서 盲管 내용물이 항원성이 있다고 하였다.

폐흡충 盲管 내용물의 항원성에 관하여는 Yogore et al.(1965)이 폐흡충의 생리식염수 추출 항원으로 免疫擴散法을 사용한 결과 항원성이 있다고 하였으며 Kim et al.(1982)은 分泌排泄 抗原으로 ELISA 검사를 실시한 결과 抗原으로 우수한 결과가 나타났다고 하였다.

이 등(1989)은 폐흡충 蟲體 組織 抗原으로 盲管 上皮의 膜 構造物과 盲管 내용물이 酵素 發色法을 사용하여 광학현미경으로 관찰한 결과 항원성이 있다고 하였다.

본 실험에서도 폐흡충에 감염된 실험 동물의 IgG로 幼若成蟲의 盲管 組織에 반응시키고 황금 입자를 표지한 결과 비교적 높은 특이적 반응이 관찰되었다.

따라서 폐흡충의 盲管 上皮의 膜 構造物과 盲管 內容物이 숙주에 항원성이 있는 것으로 생각되었다. 그러나 표피 합포체와 표피 세포의 세포질이 포함하고 있는 顆粒이나 卵黃細胞가 포함하고 있는 分泌 顆粒에 비하여 항원성이 낮은 것으로 관찰되었다. 따라서 폐흡충에 감염된 숙주는 표피 합포체와 표피 세포층에 존재하는 여러 형태의 顆粒들과 卵黃細胞가 포함하는 分泌 顆粒들에 의하여 免疫抗體가 주로 생성되고 盲管 內容物에 의해서도 다소 免疫抗體가 생성되는 것으로 생각되었다.

參 考 文 獻

Cho, K.M. and Soh, C.T.(1976) Indirect fluorescent

(←)

Fig. 7. The caecal section of a worm reacted with dog IgG from noninfected control. Gold particles were not labeled on the all area of the caecum. Bar=1 μ m($\times$ 17,000)

Fig. 8. The caecal section of a worm reacted with specific antibody(IgG) from infected dog IgG. Gold particles were predominantly labeled on the caecum tegument syncytium. Bar=1 μ m($\times$ 17,000)

- antibody technique for serodiagnosis of paragonimiasis and clonorchiasis. *Yonsei Rep. Trop. Med.*, 7:26-37.
- Cho, S.Y., Hong, S.T., Roh, Y.H., Choi, S. and Han, Y.C. (1981) Application of micro-ELISA in serodiagnosis of human paragonimiasis. *Korean J. Parasit.*, 19(2):151-156.
- Choi, W.Y., Lee, W.K. and Lee, O.R. (1975) Indirect fluorescent antibody test for diagnosis of paragonimiasis. *Korean J. Parasit.*, 13(2):152-158.
- 崔源永·李玉蘭(1981) 實驗的肺吸蟲症의 寒天沈降反應. 기생충학잡지, 19(2):101-108.
- 최원영·유재율·남호우·최형락(1986) 페디스토마 (*Paragonimus westermani*) 감염 고양이 혈청에 대한 ELISA 항체가의 의의. 기생충학잡지, 24(2):177-186.
- De Water, R., Fransen, J.A.M. and Deelder, A.M. (1986) Ultrastructural localization of the circulating amodic antigen in the digestive tract of *Schistosoma mansoni* using monoclonal antibody in an immunogold labeling procedure. *Am. J. Trop. Med. Hyg.*, 35(3):549-558.
- Fujino, T., Ikeda, T., Oikawa, Y., Fukuda, K. and Ishii, Y. (1989) Expression of a tegumental antigen during the development of *Paragonimus ohirai*. *Jpn. J. Parasitol.*, 38(5):263-270.
- Fukuda, K., Fujino, T. and Hamajima, F. (1982) Crystalline inclusions in the subtegumental cells of the adult lung fluke, *Paragonimus westermani*. *Z. Parasitenkd.*, 68:235-238.
- Huer, B., Kim, S.I., Kang, S.Y. and Cho, S.Y. (1985) Electrophoretic patterns of protein from *Paragonimus westermani* in early developmental stages. *Korean J. Parasit.*, 23(2):189-196.
- Imai, J. (1979) Studies on the antigenic analysis in *Paragonimus westermani* 2. Observations on antibody response against fractionated antigens from adult worm extract. *Trop. Med.*, 21(2):45-55 (in Japanese).
- 朱鳳德·林漢鍾·金洙鎭(1990) 免疫黃金標識法을 이용한 肝吸蟲의 體液抗原에 관한 연구. 기생충학잡지, 28(1):11-23.
- Joo, K.H., Ahn, H., Chung, M.S. and Rim, H.J. (1989) Demonstration of species-specific and cross reactive components of *Paragonimus westermani* crude worm antigen by EITB. *Korean J. Parasit.*, 27(1):9-14.
- Kim, D.C., Lee, O.Y., Lee, J.S. and Ahn, S.A. (1982) Studies on control of paragonimiasis by ELISA using secretory-excretory antigen. *Rep. NIH Korea*, 19:109-114 (in Korean).
- Kim, S.I., Ko, E.K., Kang, S.Y. and Cho, S.Y. (1986) Antigenicity of the soluble egg antigen of *Paragonimus westermani*. *J. Parasit.*, 24:49-54.
- Kim, S.J., Lee, K.O. and Capaldi, R.A. (1988) The Fine structure and immunogold labeling of the crystalline inclusion of mitochondria. *Korean J. Zool.*, 31:62-70.
- Kim, S.J., Lee, K.O., Takamiya S. and Capaldi, R.A. (1987) Mitochondrial myopathy involving uviquinol-cytochrome C oxidoreductase (complex III) identified by immunoelectron microscopy. *Biochem. Biophys. Acta*, 894:270-279.
- 김수진·임한중·송경원 (1990) 면역황금표지법을 이용한 폐흡충 체액 항원에 관한 연구. 제32회 대한기생충학회 초록집: p. 31.
- 曲華星·金洙鎭·林漢鍾 (1982) Praziquantel이 肺吸蟲에 미치는 영향에 관한 電子顯微鏡의 研究. 高麗醫大論文集, 19:617-630.
- 李玉蘭·張在景 (1986) 肺吸蟲의 粗抗原과 精製抗原에 의한 肺吸蟲感染 고양이 혈청의 免疫酵素反應. 기생충학잡지, 24(2):187-193.
- 李相文 (1981) 肺吸蟲 幼若蟲 및 成蟲 表皮의 微細構造. 中央醫大誌, 6:579-590.
- 이순형·성숙환·채종일 (1989) 폐흡충 충체 부위별 항원성에 대한 면역조직화학적 연구. 기생충학잡지, 27(2):109-117.
- Lichtenberg, F.V., Bawden, M.P. and Sealey, S.H. (1974) Origin of circulating antigen from Schistosome gut. *Am. J. Trop. Med. Hyg.*, 23(6):1,088-1,091.
- Nash, T.E. (1974) Localization of the circulating antigen within the gut of *Schistosoma mansoni*. *Am. J. Trop. Med. Hyg.*, 23(6):1,085-1,087.
- Roth, J. (1982a) The preparation of protein A-gold complexes with 3 nm and 5 nm gold particles and their use in labeling multiple antigens on ultrathin sections. *Histochem. J.*, 14:791.
- Roth, J. (1982b) Application of immunocolloids in light microscopy. Preparation of protein A-silver and protein A-gold complexes and their application for localization of single and multiple antigens in paraffin sections. *J. Histochem. Cytochem.*, 30:691-696.
- Sawada, T., Takei, K. and Yoneyama, K. (1964) Studies on the immunodiagnosis of paragonimiasis histochemistry. In diagnostic immunohistochemistry. R.A. DeLellis (ed.). Masson Pub., New York, 7-16.
- Sugiyama, H., Sugimoto, M., Akasaka, K., Horiuchi,

- T., Tomimura, T. and Kozaki, S.(1987) Characterization and localization of *Paragonimus westermani* antigen stimulating antibody formation in both the infected cat and rat. *J. Parasitol.*, 73 (2):363-367.
- Sun, T. and Gibson, J. B.(1969) The sites of antigen formation in different developmental stage of *Clonorchis sinensis*. *Jap. J. Med. Sci. Biol.*, 22: 263-272.
- 成大林·金洙鎮·嚴基善·林漢鍾(1988) 間接螢光抗體法 및 免疫黃金標識法을 이용한 肝吸蟲 組織內 항원 성분위에 관한 연구. 高麗醫大論文集, 25(3):813-827.
- Yogore, M.G., Lewert, R.M. and Madraso, E.D. (1965) Immunodiffusion studies on paragonimiasis. *Am. J. Trop. Med. Hyg.*, 14(4):586-591.
- Yokogawa, M., Tsuji, M. and Okura, T.(1962) Studies on the complement fixation test for paragonimiasis as the method of criterion of cure. *Jpn. J. Parasitol.*, 11(2):117-122.

=Abstract=

Antigenic localities in the tissues of the young adult worm of *Paragonimus westermani* using immunogold labeling method

Oh-Sung Kwon, Joon-Sang Lee, Han-Jong Rim and Soo-Jin Kim*

*Department of Parasitology and Institute for Tropical Endemic Diseases,
College of Medicine, Korea University, Seoul 136-701, and Department
of Biology*, Hallym University, Chunchon 200-702, Korea*

In order to observe the antigenic localization in the tissues of the young adult *Paragonimus westermani*, immunogold labeling method was applied using serum immunoglobulins(IgG) of the dog which infected with isolated metacercariae from *Cambaroides similis*. The sectioned worm tissue was embedded in Lowicryl HM 20 medium and stained with infected serum IgG and protein A gold complex(particle size; 12 nm). It was observed by electron microscopy at each tissues of the worm.

The gold particles were not observed on the basal lamina of the tegument, interstitial matrix of the parenchyma, the muscle tissue and mitochondria of the tegument. The gold particles were specifically labeled in the secretory granules in the vitelline cells. They were predominantly labeling on the epithelial lamella and lumen of caecum. The above finding showed that antigenic materials in young adult worm tissue were specifically concentrated on the tegumental syncytium as well as cytoplasm of tegumental cells.

[*Korean J. Parasit.*, 29(1):31-41, March 1991]