Moniezia expansa 및 *Diphylobothrium mansonii*의 葡萄糖代謝에 關한 研究

서울大學校 醫科大學 寄生蟲學敎室 및 風土病研究所

林漢鍾 · 成守賢 · 朴貞再

生 理 學 敎 室

李相敦 · 溫丙鍾 · 李憲敎

C^{14} -標識葡萄糖을 利用한 蠕蟲類의 葡萄糖代謝에 關한 研究는 Rim(1963)이 처음으로 *Ascaris lumbricoides*를 使用하여 蟲體가 培地에서 吸收한 葡萄糖이 酸化過程을 거쳐 呼吸 CO_2 및 糖原質로 合成되는데 얼마나 關與하는가에 대하여 定量的인 研究를 한 바 있다. 그 後 Seo等(1964, a,b; 1965, a,b)은 *Fasciola hepatica*, *Eurytrema pancreaticum*, *sparganum* 및 *Paramphistomum cervi*에 對하여 또 Rim等(1965)이 *Ascaridia galli*에 對하여 같은 實驗을 하였다. 그 結果 蠕蟲類의 各種類마다 葡萄糖代謝에 있어서 여러가지 差異를 나타내는 것을 알았다.

따라서 本實驗에 있어서는 條蟲類中 牛의 腸에 寄生하는 *Moniezia expansa*와 犬의 腸에 寄生하는 *Diphylobothrium mansonii*에 對하여 上記 여러 蠕蟲類에 依한 葡萄糖代謝에 關한 研究와 同一한 研究目的으로 實驗하였다.

實驗材料 및 方法

*Moniezia expansa*를 屠殺場에서 牛의 腸에서 採取하여 直時 保溫된 生理的 食鹽水에 넣어 實驗室까지 運搬하였다.

한편 *Diphylobothrium mansonii*는 巨濟島產 능그렁이(*Dinodon rufozonatum*)에서 *sparganum*을 얻어 5마리를 犬에 먹여 1個月後 屠殺하여 얻었다.

이들 蟲體를 滅菌生理的食鹽水로 充分히 洗滌한 後 抗生物質(Penicillin 2,000 units/ml 및 Streptomycin 0.1 mg/ml)을 混合한 Krebs-Ringer phosphate液에다 保存하여 實驗時(1時間 以內)까지 漸時 38°C 恒溫器內에 넣어 두었다.

C^{14} -葡萄糖含有培地는 universally labeled C^{14} -葡萄糖을 non-radioactive carrier glucose와 함께 Krebs-Ringer phosphate液 (pH 7.4)으로 희석하여 培地葡萄糖濃度を 200 mg%로 만들어 本實驗의 培地로 使用하였다. 培養

에는 50 cc容積의 小 Erlenmeyer flask內 中央에 直徑 1 cm, 높이 3 cm의 유리管을 flask底面에 附着시킨 特殊한 培養器를 使用하였고 呼吸 CO_2 를 採取하기 위하여 培養器中心管에 CO_2 free 2N.NaOH 溶液 1 cc를 넣고 10 cc의 培地를 中心管周圍에 넣은 다음 蟲體를 頭部와 未成熟片節, 成熟片節 및 受胎片節로 나누어 各各 培養器에 넣고 고무 막개로 培養器를 密閉한 다음 38°C의 Dubnoff Metabolic shaking incubator에 넣어 振盪하면서 3時間(*M. expansa*) 혹은 5時間(*D. mansonii*) 培養하였다.

一定時間培養後 呼吸 CO_2 의 放射能의 測定, 葡萄糖의 吸收率, 糖原質의 分離, 分離한 糖原質의 放射能 및 蟲體糖原質組織濃度の 測定과 여러가지 計算方法은 Rim(1963) 혹은 Seo等(1964, a)에서와 같은 方法으로 하였다.

實驗成績

條蟲類中 *Moniezia expansa* 및 *Diphylobothrium mansonii*를 C^{14} -葡萄糖이 含有되어 있는 培地에 一定時間 培養하여 蟲體에 依한 葡萄糖의 吸收率, 總 CO_2 發生率 및 蟲體가 培地에서 吸收한 葡萄糖이 酸化過程을 거쳐 呼吸 CO_2 로 關與한 定量的인 實驗成績은 Table 1 및 Table 2에서 보는 바와 같다.

*Moniezia expansa*에 있어서 C^{14} -葡萄糖含有培地에서 吸收한 葡萄糖의 吸收率을 보면 成熟片節에서 $9.33 \mu M/hr/g$ 로 가장 많았고 受胎片節 및 未成熟片節에서 各各 5.83 및 $4.22 \mu M/hr/g$ 이어서 平均 $6.46 \pm 1.23 \mu M/hr/g$ 이였다.

*M. expansa*에서 發生한 總 CO_2 發生率은 平均 $14.0 \pm 2.37 \mu M/hr/g$ 이였으며 各 片節을 보았을때 未成熟片節에서 $18.7 \mu M/hr/g$ 로 가장 많았고 成熟片節에서 $14.6 \mu M/hr/g$ 이고 受胎片節에서 $8.7 \mu M/hr/g$ 로 가장 적었다. 發生한 總 CO_2 中에 培地內의 葡萄糖에서 由來된

Table 1. The oxidation metabolism of C^{14} -glucose into respiratory CO_2 by *Moniezia expansa*.

Portion of worm	Weight of worm (g)	Glucose uptake rate ($\mu M/hr/g$)	Specific activity		Total CO_2 prod. rate ($\mu M/hr/g$)	R.S.Aco ₂ (%)	CO_2 from medium C^{14} -glucose ($\mu M/hr/g$)	Amount of glucose into resp. CO_2 ($\mu M/hr/g$)	R.G.Dco ₂ (%)
			Medium (cpm/mgC)	Resp. CO_2 (cpm/mgC)					
Immature proglottid	2.95	4.22	1,960	384	18.7	19.6	3.66	0.61	14.45
Mature progl.	4.18	9.33	1,960	670	14.6	34.2	4.99	0.83	8.90
Gravid progl.	14.22	5.83	1,960	251	8.7	12.8	1.11	0.19	3.17
Mean	7.12	6.46			14.0	22.2	3.25	0.54	8.84
$\pm$ S.E.	2.91	1.23			2.37	5.15	0.93	0.15	2.66

CO_2 의 분율 즉 R.S.Aco₂는 평균 $22.2 \pm 5.15\%$ 이었으나
 成熟片節에서 34.2%로 가장 많았고 未成熟片節 및 受
 胎片節에서는 각각 19.6% 및 12.8%이었다. 그리고 蟲體
 에 의하여 吸收된 培地內의 葡萄糖으로 부터 由來하는
 CO_2 의 發生率은 평균 $3.25 \pm 0.93 \mu M/hr/g$ 이었다. 그림
 1으로 蟲體의 呼吸 CO_2 에 關與한 培地內의 葡萄糖의 量

은 $0.54 \pm 0.15 \mu M/hr/g$ 이다.

따라서 *M. expansa*가 培地에서 吸收한 葡萄糖이 呼吸
 CO_2 로 完全酸化된 分率 즉 R.G.Dco₂는 $8.84 \pm 2.66\%$ 인
 데 片節別로 보면 未成熟片節이 14.45%로 가장 많이 關
 與하였고 다음은 成熟片節에서 8.90%이고 受胎片節에
 서 3.17%로 가장 적게 關與하였다.

Table 2. The oxidation metabolism of C^{14} -glucose into respiratory CO_2 by *Diphyllbothrium* sp.

Portion of worm	Weight of worm (g)	Glucose uptake rate ($\mu M/hr/g$)	Specific activity		Total CO_2 prod. rate ($\mu M/hr/g$)	R.S.Aco ₂ (%)	CO_2 from medium C^{14} -glucose ($\mu M/hr/g$)	Amount of glucose into resp. CO_2 ($\mu M/hr/g$)	R.G.Dco ₂ (%)
			Medium (cpm/mgC)	Resp. CO_2 (cpm/mgC)					
Immature progl.	1.39	20.7	3,210	1,577	20.48	49.1	10.05	1.68	7.96
Mature progl.	1.79	18.9	3,210	1,892	18.02	58.9	10.61	1.77	9.39
Gravid progl.	2.01	17.1	3,210	1,753	14.01	54.6	7.65	1.28	7.34
Mean	1.73	18.9			17.51	54.2	9.43	1.58	8.23
$\pm$ S.E.	0.15	0.8			1.54	2.2	0.74	0.12	0.50

*D. mansoni*에 있어서 葡萄糖吸收率을 보면 18.9 ± 0.8
 $\mu M/hr/g$ 로 *M. expansa* 보다는 約 3 배나 더 많았다.

各片節로보면 서로 差異는 심하지 않았다. 蟲體로 부
 터 發生하는 總 CO_2 發生率은 평균 $17.51 \pm 1.54 \mu M/hr/g$
 이며 未成熟片節에서 $20.48 \mu M/hr/g$ 로 가장 많았고 成
 熟片節 및 受胎片節은 각각 18.02 및 $14.01 \mu M/hr/g$ 이
 었다. R.S.Aco₂는 평균 54.2 ± 2.2 로서 成熟片節이 58.9
 %로 가장 많았고 受胎片節 및 未成熟片節은 각각 54.6
 % 및 49.1%이었다. 따라서 *D. mansoni*가 吸收한 培地
 內의 葡萄糖으로 부터 由來한 CO_2 의 發生率은 평균 9.43
 $\pm 0.74 \mu M/hr/g$ 의 값을 보였고 成熟片節 및 未成熟片節
 은 각각 10.61 및 $10.05 \mu M/hr/g$ 이었고 受胎片節에서
 $7.65 \mu M/hr/g$ 로서 가장 적었다. *D. mansoni*가 呼吸 CO_2
 에 關與한 培地內의 葡萄糖量은 평균 $1.58 \pm 0.12 \mu M/hr/g$
 이었다. 따라서 R.G.Dco₂는 평균 $8.23 \pm 0.50\%$ 로서 *M.*
*expansa*와 비슷한 값을 보였으나 成熟片節이 9.39%로
 서 가장 많이 關與하였고 未成熟片節 및 受胎片節은 각

각 7.96% 및 7.34%이어서 비슷하게 關與하였다.

한편 같은 蟲體들에 대하여 糖原質의 組織濃度와 培
 地內의 葡萄糖이 *M. expansa* 및 *D. mansoni*에 의하여 吸
 收되어 糖原質로 合成交替되는 glycogen pool의 交替率
 및 培地에서 吸收한 葡萄糖이 糖原質로 合成되는 分率은
 Table 3 및 Table 4와 같다.

Table 3에서 보는 바와 같이 *M. expansa*의 糖原質組
 織濃度는 평균 $21.2 \pm 4.61 mg/g$ 로서 蟲體 wet weight g
 當 $2.12 \pm 0.46\%$ 이며 受胎片節에서 3.24%로서 가장 많
 였고 成熟片節 및 未成熟片節에서는 각각 1.69% 및 1.43
 %로 비슷한 값을 보였다. *M. expansa*가 吸收한 培地內
 의 葡萄糖이 糖原質로 交替되는 分率 즉 R.S.Agly는 평
 均 $0.36 \pm 0.09\%$ 이어서 葡萄糖이 蟲體組織內에 糖原質
 로 時間當 交替되는 交替率을 평균 $0.12 \pm 0.03\%$ (K₁)가
 되고 蟲體의 wet weight g 當 每時間 平均 0.04 ± 0.01
 mg(K₂)의 培地內의 葡萄糖이 蟲體組織內의 糖原質과 交
 替됨을 보았다. 그런데 各片節로 보면 受胎片節이 0.07

Table 3. The anaerobic metabolism of C^{14} -glucose into glycogen by *Moniezia expansa*.

Portion of worm	Weight of worm (g)	Glucose uptake rate (mg/hr/g)	Specific activity		Glycogen pool		Turnover rate(K)			RGDgly. (%)
			medium (cpm/mgC)	glycogen (cpm/mgC)	(mg/g)	(%/g)	RSA gly. (%)	K_1 (%/hr)	K_2 (mg/hr/g)	
Immature progl.	2.95	0.76	1,960	3	14.3	1.43	0.15	0.05	0.01	1.04
Mature progl.	4.18	1.68	1,960	10	16.9	1.69	0.51	0.17	0.03	1.90
Gravid progl.	14.22	1.05	1,960	8	32.4	3.24	0.41	0.14	0.07	4.80
Mean	7.12	1.16			21.2	2.12	0.36	0.12	0.04	2.58
±S.E.	2.91	0.22			4.61	0.46	0.09	0.03	0.01	0.93

mg/hr/g로서 그 交替率 이 가장 많았고 다음은 成熟片節 0.03 mg/hr/g 이었고 未成熟片節이 가장 적어 0.01 mg/hr/g 이었다. 따라서 *M. expansa*가 培地에서 吸收한 葡萄糖中에서 糖原質로 合成된 分率 即 R.G.D gly.은 平均 $2.58 \pm 0.93\%$ 로서 亦是 受胎片節이 4.80%로서 가장 많이 關與하였고 다음이 成熟片節로서 1.90%이고 未成

熟片節이 1.04%로서 가장 적게 關與하였다.

그러나 *D. mansoni*에 있어서는 Table 4에서 보는 바와 같이 糖原質組織濃도는 平均 75.6 ± 12.4 mg/g로서 *M. expansa* 보다는 약 3.5 배나 더 많았다. 따라서 蟲體 wet weight g 당 平均 $7.56 \pm 1.24\%$ 이어서 未成熟片節 및 成熟片節에서 各各 9.09 및 9.06%로서 비슷한 값을 보

Table 4. The anaerobic metabolism of C^{14} -glucose into glycogen by *Diphyllbothrium* sp.

Portion of worm	Weight of worm (g)	Glucose uptake rate (mg/hr/g)	Specific activity		Glycogen pool		Turnover rate(K)			RGDgly. (%)
			medium (cpm/mgC)	glycogen (cpm/mgC)	(mg/g)	(%/g)	RSA gly. (%)	K_1 (%/hr)	K_2 (mg/hr/g)	
Immature progl.	1.39	3.73	3,210	439	90.9	9.09	13.7	2.74	2.38	74.0
Mature progl.	1.79	3.40	3,210	365	90.6	9.06	11.4	2.27	2.07	67.3
Gravid progl.	2.01	3.09	3,210	192	45.2	4.52	6.0	1.20	0.54	19.4
Mean	1.73	3.41			75.6	7.56	10.4	2.07	1.66	53.6
±S.E.	0.15	0.15			12.4	1.24	1.9	0.37	0.46	1.4

였으나 受胎片節에서는 4.52%로서 적은 糖原質濃도를 보였다. *D. mansoni*의 R.S.Agly.은 平均 $10.4 \pm 1.9\%$ 로서 蟲體組織內 糖原質과 時間當 交替되는 交替率은 glycogen pool의 平均 $2.07 \pm 0.37\%/hr(K_1)$ 이고 蟲體의 wet weight g 당 每時間 平均 1.66 ± 0.46 mg(K_2)의 값이 交替하고 있다. 이것을 片節로 보면 未成熟片節이 2.38 mg로서 가장 많이 交替하고 成熟片節은 2.07 mg 이고 受胎片節은 훨씬 적게 交替되어 0.54 mg 이다. 따라서 *D. mansoni*의 R.G.Dgly.은 平均 $53.6 \pm 1.4\%$ 로서 培地에서 吸收한 葡萄糖이 糖原質로의 合成過程에 比較的 많이 關與하였다. 그 중 未成熟片節이 74.0%로 가장 많이 關與하였고 成熟片節은 67.3%이었고 受胎片節은 19.4%로서 가장 적게 關與하였다. 이 點에 있어서 *M. expansa*와 顯著的한 差異를 나타내고 있다.

考 察

條蟲類의 含水炭素代謝에 關한 研究에 있어서 Read (1956)가 *Hymenolepis diminuta*를 使用하여 宿主가 攝取

한 含水炭素가 蟲體의 成長 및 生殖機能에 미치는 影響이 크다는 것을 밝힌바 있고 몇 種類의 條蟲類에 對하여 糖原質組織濃도 및 消耗率에 對하여 研究한 것이 있다. 그러나 아직까지 條蟲類에 依한 葡萄糖의 代謝過程을 定量的으로 檢討한 것은 없다. 著者들은 條蟲類에 依한 葡萄糖代謝에 關한 研究의 一環으로서 條蟲類中 우선 *Moniezia expansa* 및 *Diphyllbothrium mansoni*를 使用하여 他條蟲類에서와 같은 方法으로 葡萄糖代謝에 있어서 定量的인 實驗을 하였다.

條蟲類는 線蟲類나 吸蟲類와 같이 消化器官이 없으며 營養物質의 攝取는 主로 體表面에서 이루어진다(Smyth, 1960). 本實驗에서 葡萄糖吸收率을 보면 서로 若干의 차이를 나타내고 있다. 即 *D. mansoni*는 *M. expansa* 보다 약 3 배나 더 많이 葡萄糖을 培地內에서 吸收하고 있었다. 그러나 그 幼蟲狀態인 Sparganum(Sco et al, 1965a)은 오히려 훨씬 더 적은 값을 보였다. 그리고 같은 蟲體에 있어서는 片節에 따라서 若干의 差異를 나타내고 있었다. *M. expansa*에서는 成熟片節에서 가장 많았는데 이

는生殖機能이 가장 活潑한 곳이며서 葡萄糖의 利用率이 높아질 것으로 推定된다.

von Brand(1952)는 *M. expansa*의 糖原質組織濃度는 2.7~3.2%라 하였다. 이것은 本實驗에서도 비슷한 값을 보였다. 한편 *Diphyllobothrium latum* (von Brand 1952)에서는 1.9%이라 하였는데 本實驗에서 *D. mansoni*에서는 7.56%로서 *D. latum* 보다 極히 높은 糖原質濃度を 보였다. 그리고 片節別로 그 糖原質組織濃度を 보면 *D. mansoni*는 未成熟片節 및 成熟片節에 많았고 受胎片節에서는 적었다. 그러나 反對로 *M. expansa*는 受胎片節이 成熟片節이나 未成熟片節보다 더 많았다. 따라서 이 두 種類의 條蟲類는 葡萄糖의 酸化代謝過程에 있어서는 서로 비슷한 값을 보이고 있었으나 糖原質合成過程에 있어서는 큰 差異를 나타내고 있다. 即 培地에서 蟲體에 依하여 吸收된 葡萄糖이 糖原質로 交替되는 交替率을 보면 *D. mansoni*는 *M. expansa* 보다도 約 40 배나 더 많이 交替하였으며 *D. mansoni*는 培地에서 吸收한 葡萄糖의 53.6%가 糖原質合成에 關與하였는데 反하여 *M. expansa*는 겨우 2.58%밖에 關與하지 않았다. 그러므로 *D. mansoni*는 培地에서 吸收한 葡萄糖의 約 62%가 呼吸 CO_2 및 糖原質合成에 關與하였는데 *M. expansa*는 約 11%만이 關與하였다. 또 한편 片節別로 糖原質合成을 보면 *D. mansoni*는 未成熟片節 및 成熟片節에서 많이 關與하였고 受胎片節에서는 적게 關與하였다. *M. expansa*에서는 이와 反對로 培地에서 吸收한 葡萄糖이 糖原質合成에 受胎片節이 成熟片節과 未成熟片節보다 더 많이 關與하였다. 이와 같은 事實은 分類學的으로 *Moniezia expansa*는 輪狀吸貝類條蟲 (Cyclophyllidea)에, *Diphyllobothrium mansoni*는 僞吸貝類條蟲(Pseudophyllidea)에 屬함으로 이 두 條蟲은 形態學的으로나 또 發育過程 및 生態學的으로 完全히 다른 點으로 보아 葡萄糖代謝에 있어서는 어떤 差異를 나타내리라고는 能히 推測되는 것이며 本實驗에서 이와 같은 興味있는 事實은 앞으로 더욱 많은 種類의 條蟲類에 對한 觀察이 要望된다.

結 論

條蟲類中 牛의 腸에 寄生하고 있는 *Moniezia expansa*와 犬의 腸에 寄生하고 있는 *Diphyllobothrium mansoni*를 C^{14} -葡萄糖이 함유되어 있는 培地에 一定時間 培養하여 葡萄糖의 酸化代謝過程 및 糖原質合成過程을 定量的으로 測定하여 다음과 같은 成績을 얻었다.

1. C^{14} -葡萄糖含有培地에서 吸收한 葡萄糖吸收率을 보면 *M. expansa*는 $6.46 \pm 1.23 \mu M/hr/g$ 이며 成熟片節에서 가장 많았고 *D. mansoni*에서는 $18.9 \pm 0.8 \mu M/hr/g$

이며 未成熟片節에서 가장 많았다.

2. *M. expansa*에서 發生한 總 CO_2 發生率은 平均 $14.0 \pm 2.37 \mu M/hr/g$ 이었으며 未成熟片節에서 가장 많았고 *D. mansoni*에서 發生하는 總 CO_2 發生率은 平均 $17.51 \pm 1.54 \mu M/hr/g$ 이며 亦是 未成熟片節에서 가장 많았다. 그리고 發生한 總 CO_2 中에 培地內의 葡萄糖에서 出來된 CO_2 의 分率 R.S.Aco₂는 *M. expansa*에서는 平均 $22.2 \pm 5.15\%$ 였으나 *D. mansoni*에서는 平均 $54.2 \pm 2.2\%$ 이었고 두 種類 모두 成熟片節에서 가장 많았다.

3. 따라서 R.G.D.co₂를 보면 *M. expansa*는 平均 $8.84 \pm 2.66\%$ 이었고 *D. mansoni*에서도 平均 $8.23 \pm 0.50\%$ 로서 비슷한 값을 얻었다.

4. 糖原質組織濃度を 보면 *M. expansa*에서는 蟲體의 wet weight g 당 $2.12 \pm 0.46\%$ 이고 受胎片節에서 가장 많았으나 *D. mansoni*에서 平均 $7.56 \pm 1.24\%$ 로서 受胎片節에서 가장 적었다.

5. Glycogen pool의 交替率을 보면 *M. expansa*에서는 每時間 wet weight g 당 平均 $0.04 \pm 0.01 mg$ 인데 *D. mansoni*에서는 $1.66 \pm 0.46 mg$ 이었다. 片節別로 보면 *M. expansa*에서는 受胎片節의 交替率이 가장 많았으나 *D. mansoni*에서는 未成熟片節에서 가장 많았고 受胎片節에서 가장 적었다.

6. 따라서 R.G.Dgly는 *M. expansa*에서 平均 $2.58 \pm 0.93\%$ 가 *D. mansoni*에서 平均 $53.6 \pm 1.4\%$ 이었다.

7. 以上の 成績으로 보아 *M. expansa*는 培地에서 吸收한 葡萄糖의 11.42%, *D. mansoni*는 61.83%가 呼吸 CO_2 로의 酸化過程 및 糖原質의 合成過程에 關與하였다.

參考文獻

1. von Brand, T. (1952): Chemical physiology of endoparasitic animals. Academic Press, N.Y., 339 pp.
2. Read, C.P. (1956): Carbohydrate metabolism of *Hymenolepis diminuta*. Exptl. Parasit. 5. 325~344.
3. Rim, H.J. (1963): Metabolism of C^{14} -glucose by *Ascaris lumbricoides*. Seoul Jour. Med. 4(2), 133~142 (Korean text)
4. Rim, H.J., Kim, K.S., Seong, S.H., Rhee, S.D., On, B.J. and Lee, H.K. (1965): Metabolism of C^{14} -glucose by *Ascaridia galli*. Korean J. Parasit. 3(3), 35~39. (Korean text).
5. Seo, B.S., Rim, H.J., Kim, K.S., Rhee, S.D., Lim, S.J. and Lee, W.S. (1964, a): Metabolism of C^{14} -glucose by *Fasciola hepatica*. Korean J. Parasit. 2(3), 170~174.
6. Seo, B.S., Rim, H.J., Kim, K.S., Lee, M.S., Kim,

- Y.U. and Song, H.Y. (1964 b): Metabolism of C^{14} -glucose by *Eurytrema pancreaticum*. Korean J. Parasit. 2(3), 175~178.
7. Seo, B.S., Rim, H.J., Lee, S.I., Rhee, S.D., Lee, W.S. and Lee, J.R. (1965 a): Metabolism of C^{14} -glucose by plerocercoid of *Diphylobothrium* sp. Korean J. Parasit. 3(1), 1~4.
8. Seo, B.S., Rim, H.J., Lee, S.I., Park, D.K., and Moon, S.C. (1965 b): Metabolism of C^{14} -glucose by *Paramphistomum cervi*. Korean J. Parasit. 3(1), 5~9. (Korean text).
9. Smyth, J.D. (1963): Introduction to animal parasitology. The English Univ. Press. London, 470 pp.

— Abstract —

Metabolism of C^{14} -glucose by *Moniezia expansa* and *Diphylobothrium mansonii*

Han Jong Rim, Soo Hyun Seong, Chung Jai Park

Department of Parasitology and Institute of Endemic Diseases

and

Sang Don Rhee, Byong Jong On, Hyun Kyo Lee

Department of Physiology

College of Medicine, Seoul National University.

The adult worms of cestodes, *Moniezia expansa* and *Diphylobothrium mansonii* employed in this experiment. The worms were divided into three portions, i.e. immature, mature and gravid proglottids, and each proglottids were incubated in a certain incubation period, and the glucose uptake rate, total CO_2 production rate, tissue concentration and their radioactivities were employed as previous reports (Rim et al, 1965)

1. The glucose uptake rate by *M. expansa* was a mean value of $6.46 \pm 1.23 \mu M/hr/g$ of wet wt. and the rate by *D. mansonii* was a mean value of $18.8 \pm 0.8 \mu M/hr/g$ of wet wt. The higher rates were observed in the mature proglottid of *M. expansa* and in the immature proglottid of *D. mansonii*.

2. The total CO_2 production rates by the worms averaged $14.0 \pm 2.37 \mu M/hr/g$ in *M. expansa* and $17.51 \pm 1.54 \mu M/hr/g$ of wet wt. The relative specific activities of respiratory CO_2 (R.S.Aco₂) averaged 22.2 ± 5.15 per cent in *M. expansa* and 54.2 ± 2.2 per cent in *D. mansonii*. In the both worms, the higher values were obtained in the mature proglottids.

3. Therefore, the average value of 8.84 ± 2.66 per cent of glucose utilized by *M. expansa* and 8.23 ± 0.50 per cent of glucose utilized by *D. mansonii* from the medium glucose was oxidized into respiratory CO_2 .

4. The tissue concentrations of glycogen were a mean of $2.21 \pm 0.46\%$ of wet wt. in *M. expansa* and $7.56 \pm 1.24\%$ of wet wt. in *D. mansonii*. The higher concentration of glycogen was observed in the gravid proglottids of *M. expansa*, however the gravid proglottids of *D. mansonii* showed lower concentration of glycogen than the other proglottids.

5. The turnover rate of glycogen pool yielded with a mean of $0.04 \pm 0.01 mg/hr/g$ of wet wt. of *M. expansa*, whereas a mean of $1.66 \pm 0.46 mg/hr/g$ of wet wt. of *D. mansonii*.

6. Therefore, a mean value of 2.58 ± 0.93 per cent (R.G.Dgly) of glucose utilized by *M. expansa* and 53.6 ± 1.4 per cent by *D. mansonii* was incorporated into the glycogen.

7. These data account for that at least 11.42 per cent of the utilized glucose by *M. expansa* and 61.83 per cent of the utilized glucose by *D. mansonii* participated in furnishing the oxidation into respiratory CO_2 and the synthetic process into glycogen.